

feminum®

NAWILŻAJĄCY ŻEL INTYMNY
z kwasem mlekowym

Przeznaczenie wyrobu:

FEMINUM® żel to specjalny środek łagodzący objawy niedoboru wydzielania śluzu w pochwie.

FEMINUM® żel jest preparatem chroniącym przed otarciami prowadzącymi często do infekcji pochwy i zewnętrznych narządów płciowych.

Preparat ułatwia stosunki płciowe w przypadku suchości pochwy (także z użyciem prezerwatywy), przeprowadzanie badań ginekologicznych, ultrasonograficznych, aplikowanie tamponów, tabletek dopochwowych oraz pomiar temperatury.

Opis wyrobu:

Wyrób FEMINUM® łagodzi dolegliwości związane z suchością pochwy poprzez działanie nawilżające i poślizgowe oraz przywrócenie naturalnego, kwaśnego pH.

FEMINUM® żel może być stosowany wiele razy dziennie, bez ograniczeń wieku, regularnie i odpowiednio do potrzeb.

FEMINUM® żel jest obojętny dla skóry, a jego długotrwałe stosowanie nie zaburza równowagi hormonalnej organizmu. Używanie innych przypadkowych środków zawierających tłuszcze lub substancje nierozpuszczalne w wodzie jak kremy, mleczka kosmetyczne oraz oliwki powoduje podrażnienie, zaczerwienienie i ból.

FEMINUM® jest dobrze tolerowany przez skórę i błony śluzowe.

Nawilżający żel intymny dla kobiet FEMINUM® to klarowny, lekki żel o fizjologicznym, lekko kwaśnym odczynie (pH ok. 4,0), który sprawia, że skóra krocza nabiera dawnej elastyczności, przez co staje się bardziej odporna na otarcia i zadrapania.

FEMINUM® żel jest preparatem zupełnie neutralnym, nie pozostawiającym plam na bieliźnie.

Sposób użycia:

Należy umyć ręce przed zastosowaniem wyrobu.

Niewielką ilość żelu (w zależności od potrzeb) należy nałożyć na miejsca narażone na otarcia – także przed kontaktem intymnym lub badaniem. W razie potrzeby użyj większej ilości żelu.

Po użyciu zamknij szczelnie tubę oraz ponownie umyj ręce.

FEMINUM® żel może być aplikowany również bezpośrednio na prezerwatywę, w przeciwieństwie do innych preparatów opartych na bazie oleju.

Uwaga:

FEMINUM® żel nie jest środkiem antykoncepcyjnym.

Zaleca się ograniczyć stosowanie preparatu podczas podejmowania prób poczęcia.

Ze względów higienicznych to samo opakowanie wyrobu nie powinno być użytkowane jednocześnie przez inne osoby.

Żel FEMINUM® to wyrób niesterylny.

Środki ostrożności:

Stosowanie żelu należy przerwać w przypadku wystąpienia nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Kobiety w ciąży oraz matki karmiące piersią przed zastosowaniem wyrobu FEMINUM powinny skonsultować się z lekarzem.

W przypadku zastosowania żelu na uszkodzoną skórę lub błony śluzowe mogą wystąpić miejscowe działania niepożądane, takie jak pieczenie, podrażnienie. Działania te zazwyczaj ustępują samoistnie po wygojeniu rany.

W razie utrzymywania się tego rodzaju dolegliwości może zaistnieć konieczność odstawienia wyrobu.

Unikać kontaktu z oczami ze względu na możliwość podrażnienia.

Niewykorzystany lub przeterminowany wyrób należy wyrzucić do specjalnego pojemnika na odpady medyczne znajdującego się w aptece.




Składniki wyrobu:

gliceryna, hydroksyetyloceluloza, kwas mlekowy, hydroksybenzoesan metylu, hydroksybenzoesan propylu, woda oczyszczona.

Warunki przechowywania:

Preparat należy przechowywać w szczelnie zamkniętej tubie, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.



Dostępne opakowania: tuba 40 g, 50 g, 60 g, 75 g.

Pytania i uwagi dotyczące wyrobu prosimy kierować na adres:



masterso[®] Sp. z o.o.

Wysogotowo, ul. Skórzewska 30
62-081 Przeźmierowo
tel. +48 61 872 15 17
www.masterspharm.pl

WYRÓB MEDYCZNY



Data opracowania instrukcji: kwiecień 2023

Co to jest suchość pochwy?

Suchość pochwy jest bardzo częstą dolegliwością, która dotyka kobiety w każdym wieku, a także jest naturalnym objawem procesu starzenia.

Najczęstsze przyczyny suchości pochwy to:

- obniżony poziom estrogenów (hormonów płciowych), który występuje w okresie menopauzy, pierwszych tygodni ciąży, po porodzie i w czasie karmienia piersią,
- stosowanie niektórych leków (np. na nadciśnienie, alergię, depresję, antybiotyki),
- stosowanie tamponów,
- nadmierny wysiłek fizyczny,
- palenie tytoniu,
- stres,
- cukrzyca.

Suchość w pochwie jest głównym objawem atrofii pochwy, czyli zanikowego zapalenia pochwy, ale może być również symptomem innych chorób, jak np. infekcje bakteryjne i grzybicze.

Suchości pochwy zwykle towarzyszą inne dolegliwości, takie jak świąd pochwy i sromu, pieczenie, otarcia i ból podczas stosunku płciowego.