

ULOTKA INFORMACYJNA

ProctoLact-M®

Suplement diety

Lactobacillus rhamnosus PL1

Lactobacillus reuteri 5454

kapsułki doustne

Doustny probiotyk proktologiczny

Zastosowanie:

ProctoLact-M® przyczynia się do utrzymania prawidłowej równowagi mikrobioty jelit oraz wspomaga prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego – w szczególności końcowego odcinka odbytnicy. Przywrócenie równowagi bakteryjnej jelit znacząco wpływa na prawidłowe funkcjonowanie organizmu, w tym układu odpornościowego.

ProctoLact-M® wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mikrobioty jelitowej.

Właściwości składników ProctoLact-M®:

ProctoLact-M® zawiera specjalnie dobraną kompozycję dwóch żywych szczepów bakterii probiotycznych – *Lactobacillus rhamnosus* PL1 i *Lactobacillus reuteri* 5454, występujących naturalnie w przewodzie pokarmowym człowieka.

Szczepy te hamują namnażanie się chorobotwórczych mikroorganizmów, które są przyczyną zaburzeń prawidłowej pracy przewodu pokarmowego.

W badaniach *in vitro* potwierdzono szereg korzystnych właściwości szczepów bakterii z rodzaju *Lactobacillus* obecnych w produkcie ProctoLact-M®:

- ✓ działanie antagonistyczne w stosunku do bakterii, takich jak *Enterococcus faecalis*, patogenne szczepy *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Streptococcus agalactiae*, powodujących stany zapalne odbytu i rozwój ran okołoodbytowych,
- ✓ oporność na kwas solny i sole żółci, co umożliwi przeżywanie pasażu (przemieszczania się) przez żołądek i jelito cienkie,
- ✓ silne przyleganie (adhezja) do komórek nabłonka jelita grubego, w tym odbytnicy i odbytu.

Sposób użycia:

- **dzieci od 3. roku życia:** 1 kapsułka 1 raz dziennie,
- **dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia:** 1 kapsułka 1-2 razy dziennie.

Stosować doustnie.

Kapsułkę połknąć popijając 100 ml (połowa szklanki) letniej wody.

W przypadku braku możliwości połknięcia, zawartość kapsułki można mieszać z pokarmem lub chłodną wodą.

ProctoLact-M® najlepiej spożywać w trakcie posiłku (zapewnia to wyższą przeżywalność bakterii zawartych w preparacie).

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Ważne jest prowadzenie zdrowego trybu życia i zrównoważonego sposobu odżywiania.

Czas stosowania:

Dla utrzymania właściwej równowagi mikrobioty jelit, w tym odbytnicy i odbytu – ProctoLact-M® powinien być stosowany nie krócej niż 10 dni.

Składniki:

substancja wypełniająca – maltodekstryna ziemniaczana; inulina z korzenia cykorii; kapsułka – hydroksypropylo-metyloceluloza; liofilizowane żywe kultury bakterii (*Lactobacillus rhamnosus* PL1 i *Lactobacillus reuteri* 5454); substancja przeciwzbrylająca – dwutlenek krzemu; kwas L-askorbinowy (witamina C).

Nie zawiera tłuszczu.

Wysoka zawartość błonnika pokarmowego (inulina).

Zawartość składników w przeliczeniu na zalecaną porcję:	w 100 g produktu	w 1 kapsułce	w 2 kapsułkach	% RWS* w kapsułce
Liofilizowane żywe kultury bakterii <i>Lactobacillus rhamnosus</i> PL1 i <i>Lactobacillus reuteri</i> 5454	~500 mld CFU*	~2 mld CFU*	~4 mld CFU*	-
Tłuszcz - w tym kwasy tłuszczowe nasycone (kwasy nasycone)	0 g 0 g	0 g 0 g	0 g 0 g	0% 0%
Błonnik	29,0 g	0,1 g	0,2 g	-

*CFU – jednostka tworząca kolonię (*ang. colony-forming unit*)

#RWS – referencyjna dzienna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)

Przeciwwskazania:

Uczulenie na którykolwiek ze składników zawartych w ProctoLact-M®.

Sposób przechowywania:

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C.

Chronić przed światłem i wilgocią.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.

Dostępne opakowania:

10 kapsułek x 400 mg.

Wyprodukowano przez: Masters Sp. z o.o., Wysogotowo ul. Skórzewska 30, 62-081 Przeźmierowo

Wyprodukowano dla: Miralex Sp. z o.o., ul. Lotnicza 4, 64-920 Piła, www.miralex.pl

Data opracowania ulotki: luty 2023 r.